Procédure Pédiculose du cuir chevelu ARS - EN

Agent pathogène	Pou de tête (Pediculus humanus capitis).
Source et mode de contamination	Contamination le plus souvent par contact direct de cheveu à cheveu (via un individu porteur de lentes ou de poux). Parfois par l'intermédiaire d'objets infectés (peigne, brosse, bonnet, peluche,…)
Période d'incubation	Le cycle d'un pou comprend trois stades : - Lente qui éclot en 7 à 10 jours. - Larve qui devient adulte en 2 semaines environ. - Pou adulte.
Contagiosité	Forte. Tant que sont présents lentes et /ou poux vivants. Le pou adulte peut survivre environ 1 mois sur le cuir chevelu et une femelle peut pondre une centaine d'oeufs). Survie de 20 à 48 h en dehors de la tête et de 24h dans l'eau.
Populations présentant un risque de gravité	Pas de population particulière.

DESCRIPTION CLINIQUE – DIAGNOSTIC

Expression clinique :
Prurit ou démangeaison et lésions de grattage, petites papules, puis suintement et croûtes.
Existence de formes asymptomatiques.
Localisation : frontière du cuir chevelu (surtout régions temporales et occipitale) en particulier au niveau de la nuque.
Le **diagnostic** est posé par simple observation clinique des cheveux, si besoin à l'aide d'un peigne à poux

MESURES A PRENDRE AUTOUR D'UN CAS CONFIRME

1. Affichage et information écrite des familles et du personnel.

L'affichage et l'information aux parents et personnels peut se faire sur la base du modèle régional fourni en **Annexe 1**.


L'objectif est de favoriser le dépistage pour tous les enfants et personnels afin que toutes les personnes porteuses de poux soient traitées.

2. Éviter les contacts rapprochés tête contre tête et les échanges de bonnets, écharpes, gilets, …
3. Renforcer l'hygiène des mains des élèves et personnels : lavage plusieurs fois par jour au savon doux.

Éviter la présence d'objets en tissu au sein de l'école (draps de sieste, peluches, …) ou le cas échéant les laver à 60°C ou les placer 48 heures dans un sac plastique hermétiquement fermé.

Présence de poux à l'école !

- Attention, les poux passent facilement d'une tête à l'autre !
- **Vérifiez si vos enfants et vous-même avez des poux** en examinant les cheveux à l'aide d'un peigne à poux :








<u>Si j'ai des poux :</u>

- **Je vais à la pharmacie acheter un produit anti-poux et je l'applique** selon le mode d'emploi **sur mes cheveux**.
- Si j'ai les cheveux longs, je les attache.
- **Je lave toutes les affaires qui ont touché mes cheveux** (draps, foulard, bonnet, oreiller, …) **à 60°C ou je les enferme 2 jours dans un sac plastique bien fermé** (si elles ne passent pas à la machine) :



- **Je lave les peignes et les brosses avec un produit anti-poux**.
- Après une semaine, **je vérifie** avec un peigne à poux **si les poux sont bien partis**. Si j'ai encore des poux, je recommence tout avec un autre produit.

Toutes les personnes de la famille qui ont des poux doivent faire le traitement en même temps. En cas de persistance : consulter un médecin.